

圖 Æ て た 略 7/10 大 (川村清一博士原圖)

シテヰ

頭

部

頭 jν

巾 Æ

デ ガ ア

半球形又ハ

略球形

ルデ黄褐

色

ヲ

徑五

十三粍アル

子嚢ハ稍

紡

錘

形デ

 $70 - 100 \times 6$

大サア

IJ 絲

沔

ス

アリ

淡褐色ヲ呈シ內部

ク太 莖

D

ナ

IS

け

٧,

ネ

デ

[4]

ッ

テ

細

IJ

時

五.

껄 7

太サニ ハ充實

狀デ屢々分岐シ先端ハ

種

ナ 工

形 通 例

=

テ

ヰ

ıν ž

湯原

雑木林中ニ十月頃澤山

生 4

數 曲

個 ッ

簇生

形

變

化附

多近

中二小形ノ油胞ヲ含クミ後ニ

隔壁ガ

デ

側絲

細

イ

ノデ往々叉狀ニ分岐シ

テ

丰

jν

コ

ŀ

Æ

ア

子囊菌

寬

奥利 根 アル 原

菌へ 其 胞子ノ長イ Cudonia HILL.= 基部ガ赤褐色ョ示 ニ屬シ外形ハ L. lubrica Pers.) 中国 ニョリ、 ス 一寸づきん = 肉眼的 ŀ 多 7 ラテキ 叉 たけ 莖ガ 部 jν 太 ガ顯 古 7 古微

あ 太 力 いっけ ラ 產 **=** 地 しおう (Salicornia herbacea ・邦産ノ 就テ報告サレテヰル、 Æ ノモ)あっけしさうノ朝鮮新産地ヲ報ズ 0 circinans Fr. 1. Come of the = =

新名ヲ

附シタガ後安田氏

Ħ

リノ注意

=

3

ij

コレヲ取消

V. p. 18 (1916)

convoluta

・ヰル、) 度中

叉安田氏ハ前

記植物學雜誌

胞子ノ大サ

ヲ

Yasuda ex Lloyd, Micol. Wright.

二圖 Æ て 全形 (實大) 4. 側絲 2. 縱斷面 3. 子验 5. 胞子 (原 寬原圖)

ッ

テヲリ

胞子ノ大サヲ 35-45×2μ

ŀ

3/

テ

丰

安田

|氏ノ採品ヲ檢シテコノ差異ヲ認メ C.

學雜誌第二十九卷六〇

頁ニ發表

シテヰ

jν ŀ ヲ

C

circinans

ヲ外國ノ書ニ求

メルト頭部

縁邊ガ著シク内側

曲

Cudonia circinans

(Pers.) Fries.

同

種

ŀ

シ テ

植物

仙臺附近ニテ採集セ

jν 3

和

名

與

歐米

ス

ヲ帯ビナイ

= 漬

ŀ

= 本

IJ モ

容易 ノニ

3二區別 前記

サ づきん

jν

安 H

田

篤 =

氏 產

ナ

テ

モ

又液

'n

テ

モ

決

シ

テ

だ

如

ク

當テ テ オ イテ大キナ誤

1.

間

 $30 - 35 \times 2 \mu$

ŀ

≥⁄

テ

力 =

ラ 於テ

範圍

變化 ア

ア

y

ゥ

jν モ

ト考ヘラレ

jν

川 丰

ナ jν

IJ

形

ガ 7

變

jν

菌

デ

ハ ナ

力

U

ゥ

朝鮮、京城藥學專門學校 樂學士

都

逢

涉

產地 ニ就テハ本誌第八卷、 第三號 = 四 國 北海道及

然ル 朝鮮 あかざ科) 產地 = 就 テ 未ダ詳 カニ報ゼラレ タ jν モ ۷١ 無 イ 吾等京城

あっけしさらノ朝鮮新産地ヲ報ズ